

## ULOTKA DLA PACJENTA

### Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

# Elosone

Mometasoni furoas  
1 mg/g krem

### Skład:

1 g kremu zawiera:

- substancję czynną: mometazonu furoinian 1 mg;
- substancje pomocnicze: karbomer 1342, pemulen TR-1 NF, parafinę ciekłą, glikol heksylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, trolaminę, wodę oczyszczoną.

### Dostępne opakowania:

Tuby zawierające 15 g lub 30 g kremu.

### Podmiot odpowiedzialny:

BLAU FARMA Sp. z o.o. - Spółka Komandytowa  
ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

### Wytwórca:

Laboratorium Farmaceutyczne „HOMEOFARM” Sp. z o.o.  
ul. Jagiellońska 44, 80-366 Gdańsk

### Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Elosone krem i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Elosone krem
3. Jak stosować lek Elosone krem
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Elosone krem
6. Inne informacje

#### 1. Co to jest lek Elosone krem i w jakim celu się go stosuje

Elosone krem zawiera substancję czynną mometazonu furoinian, który jest kortykosteroidem o silnym działaniu, przeznaczonym do stosowania na skórę. Mometazonu furoinian stosowany miejscowo działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo i zwężająco na naczynia krwionośne.

#### Wskazania

Lek wskazany jest w łagodzeniu świądu i objawów zapalnych chorób skóry reagujących na leczenie kortykosteroidami, takich jak łuszczyca i atopowe zapalenie skóry.

#### 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Elosone krem

##### Nie stosować leku Elosone krem:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na mometazonu furoinian lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku,
- u dzieci w wieku poniżej 2 lat,
- w trądziku zwykłym i różowatym,
- w zapaleniu skóry dookoła ust (*dermatitis perioralis*),
- w świądzie w okolicy odbytu lub narządów płciowych,
- w grzybicy skóry, na kiłowe zmiany skórne,
- na skórę pod pieluchą,
- po szczepieniach ochronnych,
- w bakteryjnych, wirusowych (np. ospa wietrzna, opryszczka, półpasiec) i grzybiczych (np. drożdżakami i dermatofitami) zakażeniach skóry.

##### Zachować szczególną ostrożność stosując lek Elosone krem

Należy unikać stosowania leku na duże powierzchnie skóry, długotrwałego stosowania, stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym, kontaktu leku z błonami śluzowymi lub oczami oraz stosowania leku na uszkodzoną skórę i na skórę twarzy.

Miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą wchłaniać się do organizmu i powodować hamowanie czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (HPA) i wystąpienie objawów zespołu Cushinga.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u dzieci.

U dzieci z powodu większego stosunku powierzchni skóry do masy ciała, istnieje większe ryzyko zahamowania czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej wywołanej ogólnoustrojowym działaniem miejscowo stosowanych kortykosteroidów, niż u dorosłych.

Jeżeli po zastosowaniu leku Elosone krem wystąpi podrażnienie lub uczulenie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Lek szczególnie ostrożnie powinni stosować pacjenci z łuszczycą, m.in. ze względu na nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycki krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, jeśli w trakcie terapii, na leczonych miejscach na skórze pojawią się inne zmiany. Mogą one świadczyć o zakażeniu bakteryjnym lub grzybiczym.

Przed nałożeniem leku należy dokładnie oczyścić i osuszyć zmienioną chorobowo powierzchnię skóry.

#### **Ciąża**

*Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.*

Elosone krem można stosować w okresie ciąży wyłącznie wtedy, gdy lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że kortykosteroidy mogą uszkodzić płód.

#### **Karmienie piersią**

*Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.*

Leku Elosone krem nie wolno stosować w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.

#### **Przewodzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Elosone krem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

#### **Ważne informacje o niektórych składnikach leku**

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoenu i propylu parahydroksybenzoenu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

#### **Stosowanie innych leków**

*Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.*

Podczas długotrwałego stosowania leku na dużych powierzchniach skóry lub pod opatrunkami okluzyjnymi lek może:

- zaburzać działanie leków przeciwcukrzycowych,
- osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych,
- nasilać działanie glikozydów nasercowych,
- nasilać wydalanie potasu przez leki moczopędne.

### **3. Jak stosować lek Elosone krem**

Lek Elosone krem należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zwykle cienką warstwę leku Elosone krem nakłada się na zmienione chorobowo miejsca na skórze raz na dobę. Leczenie lekiem Elosone krem należy zakończyć po ustąpieniu objawów chorobowych. Jeżeli po 2 tygodniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa, konieczne jest zweryfikowanie diagnozy przez lekarza.

*W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.*

#### **W przypadku użycia większej niż zalecana dawki leku**

Po długotrwałym stosowaniu leku lub stosowaniu go na dużą powierzchnię skóry, mogą pojawić się objawy przedawkowania w postaci, np. obrzęków, nadciśnienia, nadmiernego stężenia cukru we krwi, cukromoczu, zmniejszenia odporności, a w ciężkich przypadkach choroby Cushinga. Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do zahamowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Lekarz zdecyduje, czy należy zaprzestać stosowania leku.

#### **W przypadku pominięcia dawki leku**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

### **4. Możliwe działania niepożądane**

*Jak każdy lek, lek Elosone krem może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.*

Podczas stosowania leku rzadko lub bardzo rzadko mogą wystąpić następujące miejscowe objawy niepożądane: uczucie mrowienia lub kłucia, zapalenie mieszków włosowych, uczucie pieczenia, świąd, kontaktowe zapalenie skóry, zanik barwnika, nadmierne owłosienie, wtórne zakażenia, rozstępy, zmiany trądzikopodobne, zmiany zanikowe skóry.

Podczas miejscowego stosowania innych kortykosteroidów niezbyt często obserwowano następujące objawy niepożądane w miejscu podania: podrażnienie, nadmierne owłosienie, zapalenie skóry wokół ust, macerację skóry i potówki.

Objawy te mogą również wystąpić po zastosowaniu leku Elosone krem.

Ponadto mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy. Dotyczy to szczególnie dzieci u których mogą wystąpić dodatkowo zaburzenia wzrostu i rozwoju.

*U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.*

*W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z objawów niepożądanych lub jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić o nich lekarza.*

### **5. Jak przechowywać lek Elosone krem**

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie należy stosować leku Elosone krem po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

### **6. Inne informacje**

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Nazwa: BLAU FARMA Sp. z o.o. - Spółka Komandytowa  
Adres: ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa  
tel./fax +48 (22) 824 97 32  
www.blaufarma.pl